




TEST DI AMSLER

Il test per scoprire precocemente la **MACULOPATIA** è il test di **AMSLER**. Il sintomo tipico della maculopatia è la **METAMORFOPSIA** che consiste in una visione distorta delle linee.

COME SI ESEGUE IL TEST DI AMSLER?

1. **stampare** questa pagina **senza ridimensionare il formato** in fase di stampa (formato A4)
2. **se necessario indossare gli occhiali** per leggere
3. tenere la griglia ad una **distanza di 30 – 40 centimetri**
4. **coprire** con il palmo della mano **l'occhio sinistro**
5. tenere con la mano destra il test alla **normale distanza di lettura**
6. **fissare** con l'occhio destro il **punto al centro della griglia**
7. **fare attenzione se si osservano le righe deformate, distorte, spezzate; oppure se è presente una macchia scura**
8. ripetere la **stessa procedura per l'altro occhio**



Se una qualsiasi zona della griglia appare ondulata, sfocata o scura contattare immediatamente il vostro oculista di fiducia.

Dott. Federico Badalà

Milano - Piazzale Dateo, 2 - Tel. **02 36 52 33 00** - **Roma** - V.le di Villa Massimo, 37 - Tel. **02 36 52 33 00**
Catania - Via Androne, 27 - Tel. **095 31 54 94**